



FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RESIDÊNCIA MÉDICA 2015

Clinica Médica

Gabarito da Prova realizada em 23/nov/2014

A Banca Examinadora alerta que o gabarito divulgado corresponde a um padrão de respostas esperado e não exaure as possibilidades de respostas certas. Sinonímias que mantenham o nível de precisão da resposta são consideradas igualmente corretas.

CASO 1

Questão 01	Pontuação Total: 4,0
Observar ou não reinvestigar ou conduta expectante	4,0
Questão 02	Pontuação Total: 3,0
Trombose de veia renal	3,0
Questão 03	Pontuação Total: 3,0
US Doppler de veias renais	3,0

CASO 2

Questão 04	Pontuação Total: 10,0
VITAMINA B1 (TIAMINA) VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)	TRÊS CORRETAS: 10 PONTOS; DUAS CORRETAS: 6 PONTOS; UMA CORRETA: 3 PONTOS.

CASO 3

Questão 05	Pontuação Total: 4,0
Ruptura do septo interventricular	2,0
Insuficiência mitral aguda por ruptura do músculo papilar/cordoalha tendinea	2,0
(Somente insuficiência mitral será considerado errado)	
Questão 06	Pontuação Total: 3,0
Ecocardiografia transtorácica	3,0
(ecocardiograma transesofágico é contraindicado)	
Questão 07	Pontuação Total: 3,0
Cirurgia de urgência	3,0

CASO 4

Questão 08	Pontuação Total: 2,0
Influenza, dupla adulto (ou dt), pneumococo. (Se colocar a mais ou a menos: zero. Só antitetânica: INCORRETO. Febre amarela será aceita se for de área endêmica ou for para área endêmica.)	2,0
Questão 09	Pontuação Total: 1,0
Influenza – Anual, Dupla Adulto - A Cada 10 Anos, Pneumococo Dose Única Ou Reforço Após Cinco Anos (Se colocar a cada 5 anos ou de 5 em 5 anos: INCORRETO. Se colocar a mais ou a menos: zero. Só H1N1 errado. Só será considerada correta se todas as periodicidades estiverem corretas.)	1,0
Questão 10	Pontuação Total: 1,0
INFLUENZA OU GRIPE-contraindicação relativa; precaução- E/OU FEBRE AMARELA. (Influenza ou gripe, sem observações acima: ZERO ponto).	1,0
Questão 11	Pontuação Total: 3,0
(ATENÇÃO: somente será aceita como correta a resposta que contiver a associação de método e respectivo câncer)	
Uso de preservativos nas relações sexuais (câncer de colo uterino). Não considerar diafragma ou métodos de barreira	1,0
Uso de protetor solar OU caminhar antes das 10h ou após 16h (câncer de pele).	1,0
Menor ingestão de gorduras/ carne vermelha e maior ingestão de fibras na dieta (câncer de intestino grosso).	1,0
Cessaç�o do tabagismo (c�ncer de pulm�o, cabe�a e pesco�o, es�fago, est�mago, c�lon, bexiga, mama).	1,0
Diminui�o da ingest�o de bebidas quentes (c�ncer de es�fago; est�mago).	1,0
Diminui�o da ingest�o de alimentos embutidos (c�ncer de est�mago)	1,0

Questão 12	Pontuação Total: 3,0
(ATENÇÃO: somente será aceita como correta a resposta que contiver a associação de método e respectivo câncer)	
Colonoscopia OU pesquisa de sangue oculto nas fezes (PSOF) OU Retosigmoidoscopia OU Retosigmoidoscopia + PSOF (câncer de intestino grosso).	1,0
Mamografia (câncer de mama)	1,0
Exame de Papanicolau OU inspeção colo uterino com ácido acético OU PCCU (câncer de colo uterino) OU colpocitologia oncótica. Não aceitar “exame preventivo”.	1,0
Exame dermatológico ou dermatoscopia (câncer de pele ou melanoma)	1,0

CASO 5

Questão 13	Pontuação Total: 5,0
Recebeu oxigênio em altas doses na ambulância/ hipercapnia por oxigenioterapia inadequada	5,0
Questão 14	Pontuação Total: 5,0
Ventilação não invasiva (VNI) ou BiPAP	5,0

CASO 6

Questão 15	Pontuação Total: 2,0
Megacólon tóxico	1,0
perfuração colônica ou intestinal (abdome agudo perfurativo)	1,0
Questão 16	Pontuação Total: 2,0
Intubação orotraqueal	2,0
Questão 17	Pontuação Total: 3,0
Corticoide intravenoso (metilprednisolona, hidrocortisona ou dexametasona)	3,0
Questão 18	Pontuação Total: 3,0
Proceder a cirurgia de emergência	3,0

CASO 7

Questão 19	Pontuação Total: 6,0
PACIENTE I: TEMPESTADE TIREOIDEANA OU CRISE TIREOTÓXICA	3,0
PACIENTE II: COMA MIXEDEMATOSO	3,0
Questão 20	Pontuação Total: 4,0
CORTICOESTEROIDE	4,0

CASO 8

QUESTÃO 21	Pontuação Total: 4,0
Coleta de líquido cefalorraquidiano/ punção lombar	4,0
Questão 22	Pontuação Total: 3,0
Nevralgia trigeminal	3,0
Questão 23	Pontuação Total: 3,0
Carbamazepina	3,0

CASO 9

Questão 24	Pontuação Total: 10,0
Só prolongado de bifosfonato (alendronato)	10,0

CASO 10

Questão 25	Pontuação Total: 2,0
Estudo de coorte	1,0
Retrospectiva OU histórica	1,0
Questão 26	Pontuação Total: 5,0
A-correta, B-incorreta, C-incorreta, D-correta, E-incorreta (ATENÇÃO: conforme consta na questão, cada resposta inadequada anula uma adequada).	1,0 Para cada Item
Questão 27	Pontuação Total: 3,0
Ensaio clínico ou Estudo de intervenção ou Estudo controlado	1,0
Duplo-cego	1,0
Randomizado	1,0
(Se colocar estudo observacional ou caso-controle, mesmo que coloque duplo-cego e randomizado, será considerado zero para a questão inteira).	

CASO 11

Questão 28	Pontuação Total: 2,0
S-Beta talassemia	2,0
Questão 29	Pontuação Total: 2,0
Síndrome torácica aguda	2,0
Questão 30	Pontuação Total: 2,0
Hiper-hidratação Hipersedação (ou uso excessivo de morfina ou de opioide no lugar de hipersedação)	1,0 (Para cada Item)
Questão 31	Pontuação Total: 1,0
Hidroxiureia	1,0
Questão 32	Pontuação Total: 3,0
Síndrome Hemofagocítica (hematofagocitose, linfohistiocitose hemofagocítica)	3,0

CASO 12

Questão 33	Pontuação Total: 4,0
Síndrome DRESS (reação a droga, eosinofilia, sintomas sistêmicos - Drug Reaction, Eosinophilia, Systemic Symptoms)	4,0
Questão 34	Pontuação Total: 3,0
Eosinofilia	3,0
Questão 35	Pontuação Total: 3,0
Suspensão da fenitoína	3,0

CASO 13

Questão 36	Pontuação Total: 4,0
Dosagem de alfa-fetoproteína sérica	4,0
Questão 37	Pontuação Total: 6,0
Infecção por vírus da hepatite B	2,0
Infecção por vírus da hepatite C	2,0
Etilismo	2,0

CASO 14

Questão 38	Pontuação Total: 10,0
A: Choque séptico ou sepsis ou sepse ou insuficiência respiratória ou septicemia ou disfunção múltipla de órgãos	3,0
B: Pneumonia ou pneumonia aspirativa ou sepse de foco pulmonar	2,0
C: Broncoaspiração ou disfagia	2,0
D: Câncer de esôfago (ou Carcinoma epidermoide de esôfago ou neoplasia maligna de esôfago)	3,0
ATENÇÃO: CONFORME INSTRUÍDO NA PROVA, CASO DEIXAR UM CAMPO VAZIO A QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA COM NOTA FINAL ZERO.	

CASO 15

Questão 39	Pontuação Total: 5,0
Jejum	1,0
Passagem de sonda nasogástrica	1,0
Haloperidol	1,0
Escopolamina	1,0
Dexametasona.	1,0
Questão 40	Pontuação Total: 2,0
Morfina parenteral (intravenosa ou subcutâneo)	1,0
20 mg/dia	1,0
Questão 41	Pontuação Total: 3,0
Octreotide	3,0

CASO 16

Questão 42	Pontuação Total: 2,0
Nenhum	2,0
(NÃO aceitar qualquer pedido de exame)	
Questão 43	Pontuação Total: 8,0
Risco de complicação cardíaca: manter losartana 50 mg/dia	1,0
Manter atenolol 50 mg/dia	1,0
Manter AAS 100 mg/dia	1,0
Eletrocardiograma diário nas primeiras 72h	1,0
Troponina diária nas primeiras 72h,	1,0
Torvastatina 20 mg/dia	1,0
Risco tromboembólico: enoxaparina 40mg SC ao dia, iniciar 12h antes ou no máximo 24h após o procedimento e manter por 4 semanas.	2,0
ATENÇÃO: CONFORME INSTRUÍDO NA PROVA, CASO CITE MEDICAÇÕES SEM VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSE OU TEMPO DE USO O ITEM SERÁ CONSIDERADO ERRADO.	

CASO 17

Questão 44	Pontuação Total: 2,0
Sim	2,0
Questão 45	Pontuação Total: 2,0
Teste de respiração espontânea (ou TRE) OU tubo-T OU pressão de suporte baixo (≤ 7) por 30 min á 2 horas.	2,0
Se responder SIM na questão 44, a resposta isolada de pressão de suporte baixo está correta.	2,0
Questão 46	Pontuação Total: 6,0
A) Modo volume controlado (também aceitar: volume assistido-controlado, ou volume assisto-controlado)	2,0
B) Modo pressão controlada (também aceitar: pressão assistido-controlada, pressão assisto-controlada)	2,0
C) Modo pressão de suporte	2,0

CASO 18

Questão 47	Pontuação Total: 6,0
B, C, D, A	Quatro corretas: 6 Pontos Três corretas: 4 pontos Duas corretas: 2 pontos; Uma correta: 1 ponto.
Questão 48	Pontuação Total: 4,0
Granulomatose de Wegener (Poliangeíte com granulomatose)	2,0
Poliarterite nodosa,	2,0
Churg Strauss	2,0
Poliangeíte microscópica	2,0

CASO 19

Questão 49	Pontuação Total: 4,0
Punção de Marfan ou punção pericárdica	4,0
Questão 50	Pontuação Total: 6,0
Tuberculose pericárdica	3,0
Linfoma (ou pericardite neoplásica)	3,0

CASO 20

Questão 51	Pontuação Total: 5,0
Infecção de corrente sanguínea (ou bacteremia) associada a cateter.	5,0
Se o candidato responder somente a “infecção de corrente sanguínea” SEM a associação com cateter.	2,0
Questão 52	Pontuação Total: 5,0
Trocar os antibióticos para carbapenêmicos (ou imipenem ou meropenem) e trocar o cateter de sítio (ou retirar o cateter).	5,0
(ATENÇÃO: é obrigatório responder os dois itens dessa resposta corretamente. Somente um item correto o candidato recebe ZERO ponto).	