



FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RESIDÊNCIA MÉDICA 2015

Endoscopia

Gabarito da Prova realizada em 23/nov/2014

A Banca Examinadora alerta que o gabarito divulgado corresponde a um padrão de respostas esperado e não exaure as possibilidades de respostas certas. Sinonímias que mantenham o nível de precisão da resposta são consideradas igualmente corretas.

CASO 1

Questão 01	Pontuação Total: 10,0
Observar ou não reinvestigar ou conduta expectante	10,0

CASO 2

Questão 02	Pontuação Total: 5,0
Trombose de veia renal	5,0
Questão 03	Pontuação Total: 5,0
US Doppler de veias renais	5,0

CASO 3

Questão 04	Pontuação Total: 5,0
recebeu oxigênio em altas doses na ambulância	5,0
Questão 05	Pontuação Total: 5,0
ventilação não invasiva (VNI) ou BiPAP	5,0

CASO 4

Questão 06	Pontuação Total: 2,0
Megacólon tóxico	1,0
perfuração colônica (abdome agudo perfurativo)	1,0
Questão 07	Pontuação Total: 2,0
Intubação orotraqueal	2,0
Questão 08	Pontuação Total: 3,0
Corticoide intravenoso (metilprednisolona, hidrocortisona ou dexametasona)	3,0
Questão 09	Pontuação Total: 3,0
Proceder a cirurgia de emergência	3,0

CASO 5

Questão 10	Pontuação Total: 2,0
Nenhum. (NÃO aceitar qualquer pedido de exame)	2,0
Questão 11	Pontuação Total: 8,0
a. manter losartana 50 mg/dia. b. manter atenolol 50 mg/dia. c. manter AAS 100 mg/dia. d. eletrocardiograma diário nas primeiras 72h. e. troponina diária nas primeiras 72h. f. atorvastatina 20 mg/dia	1,0 (ponto por item)
Risco tromboembólico: enoxaparina 40mg SC ao dia, iniciar 12h antes ou no máximo 24h após o procedimento e manter por 4 semanas.	2,0

CASO 6

Questão 12	Pontuação Total: 4,0
Sim	4,0
Questão 13	Pontuação Total: 6,0
Teste de respiração espontânea (ou TRE) ou tubo-T ou pressão de suporte baixo (≤ 7) por 30 min a 2 horas. Se responder SIM na tarefa 1, a resposta isolada de pressão de suporte baixo está correta	6,0

CASO 7

Questão 14	Pontuação Total: 10,0
A) Modo volume controlado (também aceitar: volume assistido-controlado, ou volume assisto-controlado) B) Modo pressão controlada (também aceitar: pressão assistido-controlada, pressão assisto-controlada) C) Modo pressão de suporte (aceitar também se candidato responder modo pressão controlada e se candidato responder que pode ser pressão de suporte ou pressão controlada)	Três respostas corretas = 10 pontos; duas respostas corretas = 6 pontos; uma resposta correta = 3 pontos.

CASO 8

Questão 15	Pontuação Total: 4,0
Punção de Marfan ou punção pericárdica	4,0
Questão 16	Pontuação Total: 6,0
Tuberculose pericárdica	3,0
linfoma (ou pericardite neoplásica)	3,0

CASO 9

Questão 17	Pontuação Total: 5,0
infecção de corrente sanguínea (ou bacteremia) associada a cateter (5 pontos. Se o candidato responder somente a infecção de corrente sanguínea SEM a associação com cateter, 2 pontos).	
Questão 18	Pontuação Total: 5,0
trocar os antibióticos para carbapenêmicos (ou imipenem ou meropenem) e trocar o cateter de sítio (ou retirar o cateter). (ATENÇÃO: é obrigatório responder os dois itens dessa resposta corretamente. Somente um item correto o candidato recebe ZERO ponto. Se os dois itens corretos, 5 pontos)	

CASO 10

Questão 19	Pontuação Total: 1,5
ISQUEMIA AGUDA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO	1,5
Questão 20	Pontuação Total: 1,5
TROMBOSE DE ANEURISMA DE POPLÍTEA	1,5
Questão 21	Pontuação Total: 3,0
EMBOLIA ARTERIAL E TROMBOSE ARTERIAL ATEROSCLERÓTICA AGUDA	3,0
Questão 22	Pontuação Total: 1,5
TROMBECTOMIA E REVASCULARIZAÇÃO	1,5
Questão 23	Pontuação Total: 1,5
FASCIOTOMIA.	1,5
Questão 24	Pontuação Total: 1,0
AMPUTAÇÃO PRIMÁRIA.	1,0

CASO 11

Questão 25	Pontuação Total: 4,0
CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREÓIDE COM METÁSTASE LINFÁTICA EM COMPARTIMENTO LATERAL	4,0
Questão 26	Pontuação Total: 3,0
PUNÇÃO-BIÓPSIA COM AGULHA FINA, DIRIGIDA POR ULTRASSONOGRAFIA, DE AMBOS OS NÓDULOS, PARA COLHEITA DE MATERIAL PARA EXAME CITOLÓGICO; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO (ALTERNATIVA: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PESCOÇO); HORMÔNIOS TIREOIDEANOS; ANTICORPOS ANTITIREOIDEANOS; LARINGOSCOPIA	3,0
Questão 27	Pontuação Total: 3,0
TIREOIDECTOMIA TOTAL; ESVAZIAMENTO CERVICAL DE COMPARTIMENTO CENTRAL; ESVAZIAMENTO CERVICAL SELETIVO DE COMPARTIMENTO LATERAL ESQUERDO, NÍVEIS II A V	3,0

CASO 12

Questão 28	Pontuação Total: 2,0
Polipose adenomatosa familiar	2,0
Síndrome polipoide	1,0
Questão 29	Pontuação Total: 4,0
Raio X de ossos da face OU crânio E Tomografia de abdome e pelve E Tomografia de crânio E Endoscopia digestiva alta = 4 pontos - qualquer combinação de 3 desses exames = 3 pontos - qualquer combinação de 2 desses exames = 2 pontos - apenas 1 desses exames = 1 ponto - fundo de olho = 1 ponto	Maximo 4,0 pontos
Questão 30	Pontuação Total: 2,0
PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM BOLSA ILEAL = 2 PONTOS PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM ILEOSTOMIA TERMINAL= 1 PONTO PROCTOCOLECTOMIA TOTAL = 1 PONTO COLECTOMIA TOTAL = ZERO	Maximo 2,0
Questão 31	Pontuação Total: 2,0
Sim. Colonoscopia pois trata-se de síndrome genética autossômica dominante (mutação do gene APC)	2,0
- Sim. Colonoscopia OU síndrome genética autossômica dominante (mutação do gene APC)	1,0
- Não	0,0

CASO 13

Questão 32	Pontuação Total: 4,0
Gastrectomia Subtotal Com Linfadenectomia D2 E Reconstrução Em Y De Roux	4,0
Gastrectomia Subtotal Com Linfadenectomia D2	3,0
Gastrectomia Parcial	1,0
Linfadenectomia D2	1,0
Reconstrução Em Y De Roux	1,0
Outra resposta	0,0
Questão 33	Pontuação Total: 3,0
8a ou ao longo da artéria hepática 9 ou do tronco celíaco 11p ou da artéria esplênica proximal 12a ou ligamento hepatoduodenal ou ao longo da artéria hepática própria	3 corretas = 3,0 pontos 2 corretas = 2,0 pontos 1 corretas = 1,0 ponto
Questão 34	Pontuação Total: 3,0
Grau de invasão na parede e metástase linfonodal e metástase à distância	2 corretas = 3,0 pontos 1 correta = 2,0 pontos outra resposta = zero

CASO 14

Questão 35	Pontuação Total: 4,0
Reconstrução pode ser com tecido autólogo (retalhos), materiais aloplásticos (prótese mamária/expansor de pele), ou associação dos dois. No caso desta paciente, pode-se reconstruir com próteses mamárias pequenas, próteses expansoras ou expansores de pele com posterior troca por próteses. Os retalhos podem ser pediculados, como o retalho do músculo reto abdominal e o grande dorsal, ou microcirúrgicos. Estes podem ser os mesmos já citados ou retalhos perfurantes (diep, sgap, igap, tap). Nos reconstruções associadas geralmente se utilizam próteses mamárias com o retalho do músculo grande dorsal.	4,0
Questão 36	Pontuação Total: 4,0
A PACIENTE APRESENTA MASTECTOMIA BILATERAL E UM BOM VOLUME DE PELE E GORDURA EM BAIXO VENTRE. O RETALHO DO MÚSCULO TRANVERSO DO ABDOME (TRAM) MONOPEDICULADO BILATERAL APRESENTA AS SEGUINTE VANTAGENS: CAPACIDADE DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL IMEDIATA, BOM VOLUME, BOM TEMPO CIRÚRGICO (PELA MÉDIA COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO E MANUTENÇÃO DA PACIENTE NA MESMA POSIÇÃO CIRÚRGICA), PROCEDIMENTO DEFINITIVO (TEMPO ÚNICO E SEM NECESSIDADE DE TROCAS POSTERIORES), SEM USO DE MATERIAL ALOPLÁSTICO (NO CASO DA PACIENTE A HISTÓRIA PRÉVIA DE USO DE SILICONE INDUSTRIAL LÍQUIDO DEVE SER CONSIDERADA).	4,0
Questão 37	Pontuação Total: 2,0
A INCISÃO MEDIANA PRÉVIA ABAIXO DO UMBIGO. CONSIDERANDO QUE O ACESSO INTRA-ABDOMINAL PELA INCISÃO MEDIANA OCORRE PELO ACESSO DIRETO NA LINHA ALBA, NÃO HAVERIA COMPROMETIMENTO DOS VASOS PERFURANTES DA REGIÃO. CONSIDERANDO O ESTUDO DAS ÁREAS DE PERFUSÃO DO TRAM MONOPEDICULADO, A INCISÃO MEDIANA PRÉVIA PODERIA SEPARAR POR COMPLETO O FLUXO DOS DOIS RETALHOS, MELHORANDO A CHANCE DE PERFUSÃO DA ZONA III DE AMBOS OS LADOS.	2,0

CASO 15

Questão 38	Pontuação Total: 2,0
ACESSO POSTERIOR, PRÉ-PERITONEAL, SEJA POR VIA ABERTA (STOPPA) OU VIDEOLAPAROSCÓPICA (TAPP OU TEP).SHOULDICE, MVCVAY, LICHTENSTEIN, BASSINI,ANDREWS, RIVES, ZIMMEREMANN, MARCY	2,0
Questão 39	Pontuação Total: 2,0
COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE POLIPROPILENO, SEJA PRÉ-PERITONEAL OU PRÉ-APONEURÓTICA. (MAYO CONSIDERADA ERRADA)	2,0
Questão 40	Pontuação Total: 4,0
(PESO 4 / 0,4 PONTOS RESPOSTA) A) PERITÔNIO (0,4) B) LIGAMENTO DE COOPER OU LIGAMENTO PECTÍNEO (0,4) C) VASOS ILÍACOS (0,4) D) VASOS EPIGÁSTRICOS INFERIORES (0,4) E) MÚSCULO RETO DO ABDOME (0,4) F) SACO HERNIÁRIO (0,4) G) DUCTO DEFERENTE (0,4) H) VASOS GONADAIS (0,4) I) ARCO APONEURÓTICO DO MÚSCULO TRANSVERSO DO ABDOME (0,4) J) SÍNFISE PÚBLICA OU PÚBLIS (0,4) K) FASCIA TRANSVERSAL (0,4) L) ANEL INGUINAL PROFUNDO (0,4) M) PSOAS * BEXIGA NÃO FOI CONSIDERADO.	4,0
Questão 41	Pontuação Total: 2,0
EVITAR O CONTATO DAS ALÇAS INTESTINAIS DIRETAMENTE COM A PRÓTESE DE POLIPROPILENO, QUE PODE LEVAR A ADERÊNCIAS E FÍSTULAS INTESTINAIS. FECHAMENTO DE QUALQUER ORIFÍCIO NO PERITÔNIO.	2,0

CASO 16

Questão 42	Pontuação Total: 2,0
LIPOSSARCOMA BEM DIFERENCIADO.	2,0
Questão 43	Pontuação Total: 2,5
T2B (2,5).	2,5
T2 (1,5)	1,5
Questão 44	Pontuação Total: 2,5
3) RESSECÇÃO MULTIVISCERAL OU RESSECÇÃO DO TUMOR COM NEFRECTOMIA, ADRENALECTOMIA E COLECTOMIA ESQUERDA (2,5). (SE ESQUECEU ÓRGÃO = 0,0)	2,5
Questão 45	Pontuação Total: 3,0
A) LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA. B) DIMENSÃO, OU TAMANHO, VOLUME DO TUMOR. C) GRAU HISTOLÓGICO OU DIFERENCIAÇÃO .	3,0

CASO 17

Questão 46	Pontuação Total: 2,5
T2B	2,5
T2	1,5
Questão 47	Pontuação Total: 2,5
LINFONODO SENTINELA OU LINFADENECTOMIA SELETIVA Não foi considerado ampliação de margem	2,5
Questão 48	Pontuação Total: 2,5
LINFADENECTOMIA INGUINAL SUPERFICIAL OU LINFADENECTOMIA INGUINAL COMPLETA OU LINFADENECTOMIA INGUINOCRURAL.	2,5
Questão 49	Pontuação Total: 2,5
LINFEDEMA.	2,5

CASO 18

Questão 50	Pontuação Total: 2,0
Punção torácica esquerda, seguida de drenagem da cavidade pleural esquerda	2,0
Questão 51	Pontuação Total: 2,0
A) FAST (<i>Focused Assessment Sonogram for Trauma</i>)	1,0
B) LPD (Lavado Peritoneal Diagnóstica)	1,0
Questão 52	Pontuação Total: 1,0
Estabilização inicial da pelve com passagem de lençol, C-Clamp , Diminuição ou fechamento do anel pélvico (Fixação da bacia não foi considerado).	1,0
Questão 53	Pontuação Total: 3,0
a) Acesso venoso calibroso b) Solução cristaloide c) Protocolo de transfusão maciça (inicialmente com sangue tipo O) d) Tipagem sanguínea para transfusão tipo-específica. e) Imobilização da bacia ou das fraturas	1,0 ponto cada
Questão 54	Pontuação Total: 2,0
a) Tamponamento pré-peritoneal com compressas. b) Fixação externa da bacia. c) Arteriografia com embolização	1,0 ponto cada

CASO 19

Questão 55	Pontuação Total: 3,0
a) Secção do pâncreas (corpo/cauda) b) Coleção no corpo pancreático (coleção preenchendo o espaço do corpo pancreático)	1,5 pontos cada
Questão 56	Pontuação Total: 3,0
a) Diafragma b) Intestino delgado (jejuno, íleo, mesentério) c) Cólon d) Bexiga e) Duodeno	1,0 Ponto Cada
Questão 57	Pontuação Total: 4,0
a) Pancreatectomia corpocaudal com drenagem da cavidade abdominal (4,0) b) Laparotomia exploradora com pancreatectomia corpocaudal e esplenectomia com drenagem da cavidade abdominal (4,0). Obs. Sem drenagem (3,0)	

CASO 20

Questão 58	Pontuação Total: 1,5
REATIVAÇÃO DA TUBERCULOSE, BRONQUIECTASIA, NEOPLASIA.	1,5
Questão 59	Pontuação Total: 1,5
MICETOMA, BOLA FÚNGICA OU ASPERGILOMA	1,5
Questão 60	Pontuação Total: 2,0
CONTAMINAÇÃO DE CAVERNA TUBERCULOSA POR FUNGOS.	2,0
CAVITAÇÃO CICATRICIAL DE TUBERCULOSE.	1,0
Questão 61	Pontuação Total: 3,0
LOBECTOMIA SUPERIOR DIREITA. EMPIEMA PLEURAL, SANGRAMENTO E FÍSTULA BRÔNQUICA. PNEUMONIA, SEGMENTECTOMIA, ACTELECTASIA, INFECÇÃO PULMONAR, PNEUMONIA FÚNGICA OU HEMOTORAX.	3,0
Questão 62	Pontuação Total: 2,0
BRONCOSCOPIA RÍGIDA COM LAVAGEM, EMBOLIZAÇÃO POR ARTERIOGRAFIA E INTUBAÇÃO SELETIVA	2,0