



FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RESIDÊNCIA MÉDICA 2015

Mastologia

Gabarito da Prova realizada em 23/nov/2014

A Banca Examinadora alerta que o gabarito divulgado corresponde a um padrão de respostas esperado e não exaure as possibilidades de respostas certas. Sinonímias que mantenham o nível de precisão da resposta são consideradas igualmente corretas.

CASO 1

Questão 01	Pontuação Total: 2,5
IB2	2,5
Questão 02	Pontuação Total: 5,0
RADIOTERAPIA COM QUIMIOTERAPIA. SEGUIDA OU NÃO DE CIRURGIA	5,0
Questão 03	Pontuação Total: 2,5
Papanicolaou a partir dos 25 anos até os 64 anos. Pode ser interrompido a partir desta idade desde que tenha dois exames consecutivos negativos nos 5 anos anteriores .	2,5

CASO 2

Questão 04	Pontuação Total: 2,5
Tumores ovarianos secretores de androgênio, hiperplasia adrenal congênita, síndrome de cushing, hirsutismo idiopático, uso de medicamentos.	2,5
Questão 05	Pontuação Total: 2,5
DISFUNÇÃO MENSTRUAL – CICLOS ESPANOMENORREICOS, AMENORREIA, CICLOS ANOVULATÓRIOS, OVÁRIOS POLICÍSTICOS -, SINAIS CLÍNICOS OU LABORATORIAIS DE HIPERANDROGENISMO, AUSÊNCIA DE OUTRAS ENDOCRINOPATIAS.	2,5
Questão 06	Pontuação Total: 5,0
TTGO (INTOLERÂNCIA À GLICOSE OU RESISTÊNCIA À INSULINA), HIPERINSULINEMIA, RELAÇÃO LH/ FSH AUMENTADA, AUMENTO DE TESTOSTERONA LIVRE OU TOTAL, AUMENTO DE ANDROSTENEDIONA, APARÊNCIA POLICÍSTICA DOS OVÁRIOS AO ULTRASSOM (12 OU MAIS FOLICULOS COM 2 A 9 MM, E/OU VOLUME OVARIANO > 10 CM ³).	5,0

CASO 3

Questão 07	Pontuação Total: 5,0
PT3 PN2.	5,0
Questão 08	Pontuação Total: 2,5
TRIPLO NEGATIVO OU BASAL-SIMILE.	2,5
Questão 09	Pontuação Total: 2,5
QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA.	2,5

CASO 4

Questão 10	Pontuação Total: 2,5
EXAME DE RASTREAMENTO É APLICADO PARA DIAGNÓSTICAR DOENÇAS EM INDIVÍDUOS (PESSOAS, MULHERES) ASSINTOMÁTICAS.	2,5
Questão 11	Pontuação Total: 5,0
SÃO SETE CATEGORIAS: - BI-RADS 0 (ZERO): ESTUDO INCOMPLETO OU É NECESSÁRIO EXAME COMPLEMENTAR. - BI-RADS 1 (UM): ACHADOS NORMAIS OU MAMOGRAFIA NEGATIVA. - BI-RADS 2 (DOIS): ACHADOS BENIGNOS. - BI-RADS 3 (TRÊS): ACHADOS PROVAVELMENTE BENIGNOS. - BI-RADS 4 (QUATRO): ACHADOS SUSPEITOS DE MALIGNIDADE. - BI-RADS 5 (CINCO): ACHADOS PROVAVELMENTE MALIGNO. - BI-RADS 6 (SEIS): CARCINOMA OU MALIGNIDADE JÁ DIAGNOSTICADA.	5,0
Questão 12	Pontuação Total: 2,5
BIÓPSIA OU EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO OU AMOSTRA HISTOLÓGICA.	2,5

CASO 5

Questão 13	Pontuação Total: 3,0
HISTEROSCOPIA COM BIÓPSIA DIRIGIDA.	3,0
Questão 14	Pontuação Total: 4,0
Obesidade, Diabetes Mellitus Tipo II, Ciclos Menstruais Amenorreicos (Ou Síndrome De Ovário Policístico), Nuliparidade, Menarca Precoce E Menopausa Tardia, Uso De Tamoxifeno, Uso De Estrogenio Sem Oposição, Hiperplasia Endometrial.	4,0
Questão 15	Pontuação Total: 3,0
TRATAMENTO COM PROGESTERONA.	3,0

CASO 6

Questão 16	Pontuação Total: 5,0
DOIS ANOS APÓS A MENARCA.	5,0
Questão 17	Pontuação Total: 2,5
ANOVULAÇÃO CRÔNICA.	2,5
Questão 18	Pontuação Total: 2,5
HIPERPROLACTINEMIA / HIPOTIREODISMO / SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS / RESISTÊNCIA PERIFÉRICA À INSULINA. HIPERPLASIA ADRENAL CONGENITA	2,5

CASO 7

Questão 19	Pontuação Total: 3,0
CONIZAÇÃO DO COLO UTERINO OU CAF (CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA).	3,0
Questão 20	Pontuação Total: 4,0
IDENTIFICAR DNA DE HPV DE ALTO RISCO.	4,0
Questão 21	Pontuação Total: 3,0
PENISCOPIA. E OU EXAME CLINICO, USO DE PRESERVATIVO E PESQUISA DE OUTRAS DSTS	3,0

CASO 8

QUESTÃO 22	Pontuação Total: 3,0
NEISSERIA GONORRHOEAE, CHLAMYDIA TRACHOMATIS, E QUAISQUER BACTÉRIAS DA FLORA INTESTINAL.	3,0
Questão 23	Pontuação Total: 4,0
DÚVIDA DIAGNÓSTICA,REFRATARIEDADE AO TRATAMENTO CLINICO, FEBRE ACIMA DE 38°C; PERITONITE DIFUSA; ABSCESSO TUBOVARIANO; NÁUSEAS E VÔMITOS; SUSPEITA DE INFECÇÃO ANAERÓBIA, CHOQUE SEPTIC	4,0
Questão 24	Pontuação Total: 3,0
PERITONITE GENERALIZADA ASSOCIADA A SINAIS DE SEPTICEMIA; 2) DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA COM ABSCESSO., ABSCESSO ROTO, FALHA DE TRATAMENTO APÓS 72H DE ANTIBIOTICOTERAPIA.	3,0

CASO 9

Questão 25	Pontuação Total: 3,0
PRESCREVER LEVONORGESTREL 0,75 MG DE 12/12 HORAS POR UM DIA, OU 1,5 MG DOSE ÚNICA OU PILULA DO DIA SEGUINTE	3,0
Questão 26	Pontuação Total: 5,0
COMPORTAMENTAIS : TABELINHA, MUCO CERVICAL, TEMPERATURA BASAL, OGINO-KNAUS, COITO INTERROMPIDO BARREIRA: PRESERVATIVO MASCULINO E FEMININO ,DIAFRAGMA	5,0
Questão 27	Pontuação Total: 2,0
DURANTE O FLUXO MENSTRUAL E CONTROLE POR ULTRASSONOGRAFIA OU EXAME CLINICO	2,0

CASO 10

Questão 28	Pontuação Total: 4,0
Histerectomia total abdominal ou Laparoscópica ou Embolização Seletiva da Artéria Uterina.	4,0
Questão 29	Pontuação Total: 4,0
Sim. Miomectomia precedida ou não de análogo do GnRH.	4,0
Questão 30	Pontuação Total: 2,0
Infiltração do endométrio no miométrio, ultrapassando a camada subjuncional.	2,0

CASO 11

Questão 31	Pontuação Total: 4,0
CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREÓIDE COM METÁSTASE LINFÁTICA EM COMPARTIMENTO LATERAL	4,0
Questão 32	Pontuação Total: 3,0
PUNÇÃO-BIÓPSIA COM AGULHA FINA, DIRIGIDA POR ULTRASSONOGRAFIA, DE AMBOS OS NÓDULOS, PARA COLHEITA DE MATERIAL PARA EXAME CITOLÓGICO; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO (ALTERNATIVA: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PESCOÇO); HORMÔNIOS TIREOIDEANOS; ANTICORPOS ANTITIREOIDEANOS; LARINGOSCOPIA	3,0
Questão 33	Pontuação Total: 3,0
TIREOIDECTOMIA TOTAL; Esvaziamento cervical de compartimento central; Esvaziamento cervical seletivo de compartimento lateral esquerdo, NÍVEIS II a V	3,0

CASO 12

Questão 34	Pontuação Total: 2,0
Polipose adenomatosa familiar	2,0
Síndrome polipoide	1,0
Questão 35	Pontuação Total: 4,0
Raio X de ossos da face OU crânio E Tomografia de abdome e pelve E Tomografia de crânio E Endoscopia digestiva alta = 4 pontos - qualquer combinação de 3 desses exames = 3 pontos - qualquer combinação de 2 desses exames = 2 pontos - apenas 1 desses exames = 1 ponto - fundo de olho = 1 ponto	Maximo 4,0 pontos
Questão 36	Pontuação Total: 2,0
PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM BOLSA ILEAL = 2 PONTOS PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM ILEOSTOMIA TERMINAL= 1 PONTO PROCTOCOLECTOMIA TOTAL = 1 PONTO COLECTOMIA TOTAL = ZERO	Máximo 2,0
Questão 37	Pontuação Total: 2,0
Sim. Colonoscopia pois trata-se de síndrome genética autossômica dominante (mutação do gene APC)	2,0
- Sim. Colonoscopia OU síndrome genética autossômica dominante (mutação do gene APC)	1,0
- Não	0,0

CASO 13

Questão 38	Pontuação Total: 4,0
Gastrectomia Subtotal Com Linfadenectomia D2 E Reconstrução Em Y De Roux	4,0
Gastrectomia Subtotal Com Linfadenectomia D2	3,0
Gastrectomia Parcial	1,0
Linfadenectomia D2	1,0
Reconstrução Em Y De Roux	1,0
Outra resposta	0,0
Questão 39	Pontuação Total: 3,0
8a ou ao longo da artéria hepática 9 ou do tronco celíaco 11p ou da artéria esplênica proximal 12a ou ligamento hepatoduodenal ou ao longo da artéria hepática própria	3 corretas = 3,0 pontos 2 corretas = 2,0 pontos 1 corretas = 1,0 ponto
Questão 40	Pontuação Total: 3,0
Grau de invasão na parede e metástase linfonodal e metástase à distância	2 corretas = 3,0 pontos 1 correta = 2,0 pontos outra resposta = zero

CASO 14

Questão 41	Pontuação Total: 4,0
Reconstrução pode ser com tecido autólogo (retalhos), materiais aloplásticos (prótese mamária/expansor de pele), ou associação dos dois. No caso desta paciente, pode-se reconstruir com próteses mamárias pequenas, próteses expansoras ou expansores de pele com posterior troca por próteses. Os retalhos podem ser pediculados, como o retalho do músculo reto abdominal e o grande dorsal, ou microcirúrgicos. Estes podem ser os mesmos já citados ou retalhos perfurantes (diep, sgap, igap, tap). Nos reconstruções associadas geralmente se utilizam próteses mamárias com o retalho do músculo grande dorsal.	4,0
Questão 42	Pontuação Total: 4,0
A PACIENTE APRESENTA MASTECTOMIA BILATERAL E UM BOM VOLUME DE PELE E GORDURA EM BAIXO VENTRE. O RETALHO DO MÚSCULO TRANVERSO DO ABDOME (TRAM) MONOPEDICULADO BILATERAL APRESENTA AS SEGUINTE VANTAGENS: CAPACIDADE DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL IMEDIATA, BOM VOLUME, BOM TEMPO CIRÚRGICO (PELA MÉDIA COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO E MANUTENÇÃO DA PACIENTE NA MESMA POSIÇÃO CIRÚRGICA), PROCEDIMENTO DEFINITIVO (TEMPO ÚNICO E SEM NECESSIDADE DE TROCAS POSTERIORES), SEM USO DE MATERIAL ALOPLÁSTICO (NO CASO DA PACIENTE A HISTÓRIA PRÉVIA DE USO DE SILICONE INDUSTRIAL LÍQUIDO DEVE SER CONSIDERADA).	4,0
Questão 43	Pontuação Total: 2,0
A INCISÃO MEDIANA PRÉVIA ABAIXO DO UMBIGO. CONSIDERANDO QUE O ACESSO INTRA-ABDOMINAL PELA INCISÃO MEDIANA OCORRE PELO ACESSO DIRETO NA LINHA ALBA, NÃO HAVERIA COMPROMETIMENTO DOS VASOS PERFURANTES DA REGIÃO. CONSIDERANDO O ESTUDO DAS ÁREAS DE PERFUSÃO DO TRAM MONOPEDICULADO, A INCISÃO MEDIANA PRÉVIA PODERIA SEPARAR POR COMPLETO O FLUXO DOS DOIS RETALHOS, MELHORANDO A CHANCE DE PERFUSÃO DA ZONA III DE AMBOS OS LADOS.	2,0

CASO 15

Questão 44	Pontuação Total: 2,0
ACESSO POSTERIOR, PRÉ-PERITONEAL, SEJA POR VIA ABERTA (STOPPA) OU VIDEOLAPAROSCÓPICA (TAPP OU TEP).SHOULDICE, MVCVAY, LICHTENSTEIN, BASSINI,ANDREWS, RIVES, ZIMMEREMANN, MARCY	2,0
Questão 45	Pontuação Total: 2,0
COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE POLIPROPILENO, SEJA PRÉ-PERITONEAL OU PRÉ-APONEURÓTICA. (MAYO CONSIDERADA ERRADA)	2,0
Questão 46	Pontuação Total: 4,0
a) peritônio (0,4) b) ligamento de cooper ou ligamento pectíneo (0,4) c) vasos ilíacos (0,4) d) vasos epigástricos inferiores (0,4) e) músculo reto do abdome (0,4) f) saco herniário (0,4) g) ducto deferente (0,4) h) vasos gonadais (0,4) i) arco aponeurótico do músculo transverso do abdome (0,4) j) sínfise púbica ou púbis (0,4) k) fascia transversal (0,4) l) anel inguinal profundo (0,4) m) psoas * bexiga não foi considerado	Maximo 4,0 Pontos
Questão 47	Pontuação Total: 2,0
EVITAR O CONTATO DAS ALÇAS INTESTINAIS DIRETAMENTE COM A PRÓTESE DE POLIPROPILENO, QUE PODE LEVAR A ADERÊNCIAS E FÍSTULAS INTESTINAIS. FECHAMENTO DE QUALQUER ORIFÍCIO NO PERITÔNIO.	2,0

CASO 16

Questão 48	Pontuação Total: 2,0
LIPOSSARCOMA BEM DIFERENCIADO	2,0
Questão 49	Pontuação Total: 2,5
T2B	2,5
T2	1,5
Questão 50	Pontuação Total: 2,5
RESSECÇÃO MULTIVISCERAL OU RESSECÇÃO DO TUMOR COM NEFRECTOMIA, ADRENALECTOMIA E COLECTOMIA ESQUERDA (SE ESQUECEU ÓRGÃO = 0,0)	2,5
Questão 51	Pontuação Total: 3,0
A) Localização anatômica. B) Dimensão, ou tamanho, volume do tumor. C) Grau histológico ou diferenciação.	1,0 (Ponto Cada)

CASO 17

Questão 52	Pontuação Total: 2,5
T2B	2,5
T2	1,5
Questão 53	Pontuação Total: 2,5
LINFONODO SENTINELA OU LINFADENECTOMIA SELETIVA (NÃO FOI CONSIDERADO AMPLIAÇÃO DE MARGEM)	2,5
Questão 54	Pontuação Total: 2,5
LINFADENECTOMIA INGUINAL SUPERFICIAL OU LINFADENECTOMIA INGUINAL COMPLETA OU LINFADENECTOMIA INGUINOCRURA	2,5
Questão 55	Pontuação Total: 2,5
LINFEDEMA.	2,5

CASO 18

Questão 56	Pontuação Total: 2,0
Punção torácica esquerda, seguida de drenagem da cavidade pleural esquerda	2,0
Questão 57	Pontuação Total: 2,0
A) FAST (<i>Focused Assessment Sonogram for Trauma</i>)	1,0
B) LPD (Lavado Peritoneal Diagnóstica)	1,0
Questão 58	Pontuação Total: 1,0
Estabilização inicial da pelve com passagem de lençol, C-Clamp , Diminuição ou fechamento do anel pélvico (Fixação da bacia não foi considerado).	1,0
Questão 59	Pontuação Total: 3,0
a) Acesso venoso calibroso b) Solução cristaloide c) Protocolo de transfusão maciça (inicialmente com sangue tipo O) d) Tipagem sanguínea para transfusão tipo-específica. e) Imobilização da bacia ou das fraturas	1,0 ponto cada
Questão 60	Pontuação Total: 2,0
a) Tamponamento pré-peritoneal com compressas. b) Fixação externa da bacia. c) Arteriografia com embolização	1,0 ponto cada

CASO 19

Questão 61	Pontuação Total: 3,0
a) Secção do pâncreas (corpo/cauda) b) Coleção no corpo pancreático (coleção preenchendo o espaço do corpo pancreático)	1,5 pontos cada
Questão 62	Pontuação Total: 3,0
a) Diafragma b) Intestino delgado (jejuno, íleo, mesentério) c) Cólon d) Bexiga e) Duodeno	1,0 Ponto Cada
Questão 63	Pontuação Total: 4,0
a) Pancreatectomia corpocaudal com drenagem da cavidade abdominal (4,0) b) Laparotomia exploradora com pancreatectomia corpocaudal e esplenectomia com drenagem da cavidade abdominal (4,0). Obs. Sem drenagem (3,0)	

CASO 20

Questão 64	Pontuação Total: 1,5
REATIVAÇÃO DA TUBERCULOSE, BRONQUIECTASIA, NEOPLASIA.	1,5
Questão 65	Pontuação Total: 1,5
MICETOMA, BOLA FÚNGICA OU ASPERGILOMA	1,5
Questão 66	Pontuação Total: 2,0
CONTAMINAÇÃO DE CAVERNA TUBERCULOSA POR FUNGOS.	2,0
CAVITAÇÃO CICATRICIAL DE TUBERCULOSE.	1,0
Questão 67	Pontuação Total: 3,0
LOBECTOMIA SUPERIOR DIREITA. EMPIEMA PLEURAL, SANGRAMENTO E FÍSTULA BRÔNQUICA. PNEUMONIA, SEGMENTECTOMIA, ACTELECTASIA, INFECÇÃO PULMONAR, PNEUMONIA FÚNGICA OU HEMOTORAX.	3,0
Questão 68	Pontuação Total: 2,0
BRONCOSCOPIA RÍGIDA COM LAVAGEM, EMBOLIZAÇÃO POR ARTERIOGRAFIA E INTUBAÇÃO SELETIVA	2,0