



FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RESIDÊNCIA MÉDICA 2015

Cirurgia Geral

Gabarito da Prova realizada em 23/nov/2014

A Banca Examinadora alerta que o gabarito divulgado corresponde a um padrão de respostas esperado e não exaure as possibilidades de respostas certas. Sinonímias que mantenham o nível de precisão da resposta são consideradas igualmente corretas.

CASO 1

Questão 01	Pontuação Total: 4,0
CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREÓIDE COM METÁSTASE LINFÁTICA EM COMPARTIMENTO LATERAL	4,0
Questão 02	Pontuação Total: 3,0
PUNÇÃO-BIÓPSIA COM AGULHA FINA, DIRIGIDA POR ULTRASSONOGRRAFIA, DE AMBOS OS NÓDULOS, PARA COLHEITA DE MATERIAL PARA EXAME CITOLÓGICO; TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO (ALTERNATIVA: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PESCOÇO); HORMÔNIOS TIREOIDEANOS; ANTICORPOS ANTITIREOIDEANOS; LARINGOSCOPIA	3,0
Questão 03	Pontuação Total: 3,0
TIREOIDECTOMIA TOTAL; ESVAZIAMENTO CERVICAL DE COMPARTIMENTO CENTRAL; ESVAZIAMENTO CERVICAL SELETIVO DE COMPARTIMENTO LATERAL ESQUERDO, NÍVEIS II A V	3,0

CASO 2

Questão 04	Pontuação Total: 2,0
ACESSO POSTERIOR, PRÉ-PERITONEAL, SEJA POR VIA ABERTA (STOPPA) OU VIDEOLAPAROSCÓPICA (TAPP OU TEP).SHOULDICE, MVCVAY, LICHTENSTEIN, BASSINI,ANDREWS, RIVES, ZIMMEREMANN, MARCY	2,0
Questão 05	Pontuação Total: 2,0
COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE POLIPROPILENO, SEJA PRÉ-PERITONEAL OU PRÉ-APONEURÓTICA. (MAYO CONSIDERADA ERRADA)	2,0
Questão 06	Pontuação Total: 4,0
(PESO 4 / 0,4 PONTOS RESPOSTA) A) PERITÔNIO (0,4) B) LIGAMENTO DE COOPER OU LIGAMENTO PECTÍNEO (0,4) C) VASOS ILÍACOS (0,4) D) VASOS EPIGÁSTRICOS INFERIORES (0,4) E) MÚSCULO RETO DO ABDOME (0,4) F) SACO HERNIÁRIO (0,4) G) DUCTO DEFERENTE (0,4) H) VASOS GONADAIS (0,4) I) ARCO APONEURÓTICO DO MÚSCULO TRANSVERSO DO ABDOME (0,4) J) SÍNFISE PÚBLICA OU PÚBLIS (0,4) K) FASCIA TRANSVERSAL (0,4) L) ANEL INGUINAL PROFUNDO (0,4) M) PSOAS * BEXIGA NÃO FOI CONSIDERADO.	4,0
Questão 07	Pontuação Total: 2,0
EVITAR O CONTATO DAS ALÇAS INTESTINAIS DIRETAMENTE COM A PRÓTESE DE POLIPROPILENO, QUE PODE LEVAR A ADERÊNCIAS E FÍSTULAS INTESTINAIS. FECHAMENTO DE QUALQUER ORIFÍCIO NO PERITÔNIO.	2,0

CASO 3

Questão 08	Pontuação Total: 3,0
a) Perda de peso. b) Fisioterapia respiratória. c) Pneumoperitônio progressivo.	1,0 (Ponto cada item)
Questão 09	Pontuação Total: 4,0
a) Monitorização transoperatória da pressão intra-abdominal e endotraqueal. b) Laparotomia e avaliação da cavidade abdominal. c) Redução do conteúdo herniário e tratamento do defeito da parede abdominal com prótese (tela). d) Dermolipectomia com tratamento da pele e subcutâneo. e) Visceroredução. f) Incisões relaxadora. g) Avanço miofascial. h) lise de aderência. (Não foi considerado: colecistectomia e apendicectomia)	1,0 (Ponto cada item)
Questão 10	Pontuação Total: 3,0
Prevenção da síndrome compartimental abdominal ou da hipertensão intra-abdominal. (Não foi considerado Perda de domicílio e Insuficiência respiratória)	3,0

CASO 4

Questão 11	Pontuação Total: 2,0
. LIPOSSARCOMA BEM DIFERENCIADO.	2,0
Questão 12	Pontuação Total: 2,5
T2B (2,5).	2,5
T2 (1,5)	1,5
Questão 13	Pontuação Total: 2,5
3) RESSECÇÃO MULTIVISCERAL OU RESSECÇÃO DO TUMOR COM NEFRECTOMIA, ADRENALECTOMIA E COLECTOMIA ESQUERDA (2,5). (SE ESQUECEU ÓRGÃO = 0,0)	2,5
Questão 14	Pontuação Total: 3,0
A) LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA. B) DIMENSÃO, OU TAMANHO, VOLUME DO TUMOR. C) GRAU HISTOLÓGICO OU DIFERENCIAÇÃO .	3,0

CASO 5

Questão 15	Pontuação Total: 2,5
T2B	2,5
T2	1,5
Questão 16	Pontuação Total: 2,5
LINFONODO SENTINELA OU LINFADENECTOMIA SELETIVA Não foi considerado ampliação de margem	2,5
Questão 17	Pontuação Total: 2,5
LINFADENECTOMIA INGUINAL SUPERFICIAL OU LINFADENECTOMIA INGUINAL COMPLETA OU LINFADENECTOMIA INGUINOCRURAL.	2,5
Questão 18	Pontuação Total: 2,5
LINFEDEMA.	2,5

CASO 6

Questão 19	Pontuação Total: 2,0
A) SEPSE	1,0
B) SEPSE GRAVE OU SEVERA	2,0
SE ESCREVER CHOQUE SÉPTICO, RECEBE ZERO (0). ESTA RESPOSTA É INACEITÁVEL.	
Questão 20	Pontuação Total: 1,0
ACIDOSE METABÓLICA COMPENSADA	0,5
ACIDOSE METABÓLICA	1,0
Questão 21	Pontuação Total: 1,0
A) METABOLISMO ANAERÓBICO OU B) METABOLISMO LÁCTICO OU C) DESVIO DO METABOLISMO DO CICLO DE KREBS OU D) MÁ PERFUSÃO TECIDUAL E) HIPOXEMIA	1,0
QUESTÃO 22	Pontuação Total: 3,0
A) CÁLCIO B) BICARBONATO DE SÓDIO C) DIÁLISE D) INALAÇÃO COM AGONISTA BETA 2 E) SOLUÇÃO POLARIZANTE SE ESCREVER DIURÉTICO OU DIURÉTICO DE ALÇA, RESINAS TROCADORAS, SORCAL, KAYXALATE. RECEBE ZERO (0,0)	1,0 (Ponto cada Item)

QUESTÃO 23	Pontuação Total: 3,0
A) HIDRATAÇÃO OU REPOSIÇÃO VOLÊMICA B) COLETA DE CULTURAS (HEMO,URO E POSSÍVEL FOCO EVIDENTE) C) ANTIBIÓTICO D) INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PRECOCE E) “CLAREAR” (SERIAR, MONITORAR) O LACTATO F) TENTAR OBTER SATURAÇÃO VENOSA CENTRAL DE CERCA DE 70% (NÃO CONSIDERAR PCR; CATETER CENTRAL)	1,0 Ponto por item

CASO 7

Questão 24	Pontuação Total: 3,0
A) AUSÊNCIA DE CONTRASTE NA VIA BILIAR INTRA-HEPÁTICA B) CONTRASTAÇÃO APENAS DO COLÉDOCO C) AUSÊNCIA DE CÁLCULOS NA VIA BILIAR CONTRASTADA D) DRENAGEM ADEQUADA DO CONTRASTE PARA O DUODENO E) NÃO VISUALIZAÇÃO DO DUCTO CÍSTICO	1,0 Ponto por item
Questão 25	Pontuação Total: 3,0
LESÃO IATROGÊNICA DA VIA BILIAR OU CATETERIZAÇÃO DO COLÉDOCO	3,0
PAPILOTOMIA AMPLA	1,0
CÁLCULO ACIMA DO CATETER	1,0
COLEDOLITÍASE	1,0
Questão 26	Pontuação Total: 4,0
REPARO DA LESÃO DO COLÉDOCO, COM COLOCAÇÃO DE DRENO DE KEHR	4,0
RETIRADA DE CÁLCULO	1,0
COLANGIOGRAFIA COM MUDANÇA DE POSIÇÃO	1,0

CASO 8

Questão 27	Pontuação Total: 3,0
HEMATOMA DE INTESTINO DELGADO	3,0
SUBOCCLUSÃO INTESTINAL	1,0
AA OBSTRUTIVO	1,0
INTOXICAÇÃO CUMARÍNICA	1,0
DISTÚRBIO DE COAGULAÇÃO	1,0
Questão 28	Pontuação Total: 3,0
A) ESPESSAMENTO DE INTESTINO DELGADO B) ESPESSAMENTO DE MESENTÉRIO C) BORRAMENTO DE GORDURA MESENTERIAL (OBS: EDEMA DE DELGADO NÃO FOI CONSIDERADO)	(1,5 por item)
Questão 29	Pontuação Total: 4,0
A) JEJUM (2,0) B) Sonda GÁSTRICA ABERTA OU DESCOMPRESSÃO GÁSTRICA (2,0) C) HIDRATAÇÃO INTRAVENOSA (2,0) D) REVERSÃO DA ANTICOAGULAÇÃO (2,0) E) PLASMA FRESCO CONGELADO (1,0) F) VITAMINA K (1,0) G) CONTROLE DA COAGULAÇÃO (1,0) H) COMPLEXO PROTROMBINICO (1,0) I) SUSPENSÃO WARFARINA (1,0)	Máximo 4,0 Pontos

CASO 9

Questão 30	Pontuação Total: 2,0
Punção torácica esquerda, seguida de drenagem da cavidade pleural esquerda	2,0
Questão 31	Pontuação Total: 2,0
A) FAST (<i>Focused Assessment Sonogram for Trauma</i>)	1,0
B) LPD (Lavado Peritoneal Diagnóstica)	1,0
Questão 32	Pontuação Total: 1,0
Estabilização inicial da pelve com passagem de lençol, C-Clamp , Diminuição ou fechamento do anel pélvico (Fixação da bacia não foi considerado).	1,0
Questão 33	Pontuação Total: 3,0
a) Acesso venoso calibroso b) Solução cristalóide c) Protocolo de transfusão maciça (inicialmente com sangue tipo O) d) Tipagem sanguínea para transfusão tipo-específica. e) Imobilização da bacia ou das fraturas	1,0 ponto cada
Questão 34	Pontuação Total: 2,0
a) Tamponamento pré-peritoneal com compressas. b) Fixação externa da bacia. c) Arteriografia com embolização	1,0 ponto cada

CASO 10

Questão 35	Pontuação Total: 3,0
a) Secção do pâncreas (corpo/cauda) b) Coleção no corpo pancreático (coleção preenchendo o espaço do corpo pancreático)	1,5 pontos cada
Questão 36	Pontuação Total: 3,0
a) Diafragma b) Intestino delgado (jejuno, íleo, mesentério) c) Cólon d) Bexiga e) Duodeno	1,0 Ponto Cada
Questão 37	Pontuação Total: 4,0
a) Pancreatectomia corpocaudal com drenagem da cavidade abdominal (4,0) b) Laparotomia exploradora com pancreatectomia corpocaudal e esplenectomia com drenagem da cavidade abdominal (4,0). Obs. Sem drenagem (3,0)	

CASO 11

Questão 38	Pontuação Total: 2,0
Polipose adenomatosa familiar	2,0
Síndrome polipoide	1,0
Questão 39	Pontuação Total: 4,0
Raio X de ossos da face OU crânio E Tomografia de abdome e pelve E Tomografia de crânio E Endoscopia digestiva alta = 4 pontos - qualquer combinação de 3 desses exames = 3 pontos - qualquer combinação de 2 desses exames = 2 pontos - apenas 1 desses exames = 1 ponto - fundo de olho = 1 ponto	Maximo 4,0 pontos
Questão 40	Pontuação Total: 2,0
PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM BOLSA ILEAL = 2 PONTOS PROCTOCOLECTOMIA TOTAL COM ILEOSTOMIA TERMINAL= 1 PONTO PROCTOCOLECTOMIA TOTAL = 1 PONTO COLECTOMIA TOTAL = ZERO	Maximo 2,0
Questão 41	Pontuação Total: 2,0
Sim. Colonoscopia pois trata-se de síndrome genética autossômica dominante (mutação do gene APC)	2,0
- Sim. Colonoscopia OU síndrome genética autossômica dominante (mutação do gene APC)	1,0
- Não	0,0

CASO 12

Questão 42	Pontuação Total: 3,0
esofagite eosinofílica	3,0
doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) / esofagite de refluxo / megaesôfago / estenose esofágica = zero	
Questão 43	Pontuação Total: 3,0
biópsias seriadas do esôfago com pesquisa do número de eosinófilos	3,0
biópsias do esôfago	2,0
manometria e/ou phmetria ou impedanciophmetria	1,0
outra resposta = zero	
Questão 44	Pontuação Total: 4,0
uso de anti-alérgicos e/ou inibidores de leucotrieno e/ou corticóide	4,0
uso de inibidores de bomba de prótons / omeprozol ou outros inibidores	
cirurgia ou qualquer outra resposta = zero	

CASO 13

Questão 45	Pontuação Total: 4,0
Gastrectomia Subtotal Com Linfadenectomia D2 E Reconstrução Em Y De Roux	4,0
Gastrectomia Subtotal Com Linfadenectomia D2	3,0
Gastrectomia Parcial	1,0
Linfadenectomia D2	1,0
Reconstrução Em Y De Roux	1,0
Outra resposta	0,0
Questão 46	Pontuação Total: 3,0
8a ou ao longo da artéria hepática 9 ou do tronco celíaco 11p ou da artéria esplênica proximal 12a ou ligamento hepatoduodenal ou ao longo da artéria hepática própria	3 corretas = 3,0 pontos 2 corretas = 2,0 pontos 1 corretas = 1,0 ponto
Questão 47	Pontuação Total: 3,0
Grau de invasão na parede e metástase linfonodal e metástase à distância	2 corretas = 3,0 pontos 1 correta = 2,0 pontos outra resposta = zero

CASO 14

Questão 48	Pontuação Total: 30
HEMANGIOMA HEPÁTICO	3,0
OUTRA RESPOSTA = ZERO	
Questão 49	Pontuação Total: 3,0
- ENCHIMENTO PERIFÉRICO (GLOBULIFORME) E CENTRÍPETO DE CONTRASTE (FLUXO LENTO) (APENAS 1 DESSAS CARACTERÍSTICAS = 1 PONTO)	3,0
Questão 50	Pontuação Total: 2,0
NÃO	2,0
SIM = ZERO	
Questão 51	Pontuação Total: 2,0
NÃO É NECESSÁRIO TRATAMENTO (ACOMPANHAMENTO CLÍNICO)	2,0
OUTRA RESPOSTA = ZERO PONTO	

CASO 15

Questão 52	Pontuação Total: 3,0
NEOPLASIA CÍSTICA MUCINOSA DO PÂNCREAS	3,0
LESÃO CÍSTICA OU CISTO DO PÂNCREAS	3,0
CISTO DE PÂNCREAS, CISTO RETROPERITONEAL, PSEUDOCISTO DE PÂNCREAS, MASSA NA CAUDA DE PÂNCREAS, TUMORAÇÃO HOMOGÊNEA DE PÂNCREAS, COLEÇÃO PERIPANCREÁTICA.	1,0
Questão 53	Pontuação Total: 3,0
NÃO	2,0
SIM = ZERO	0,0
JUSTIFICATIVA: EXAME SUFICIENTE PARA DEFINIR TRATAMENTO / CIRURGIA	1,0
Questão 54	Pontuação Total: 4,0
PANCREATECTOMIA DISTAL COM ESPLENECTOMIA	2,0
PANCREATECTOMIA	1,0
Porque: Risco de malignidade	2,0

CASO 16

Questão 55	Pontuação Total: 2,0
TUMOR DE WILMS OU NEFROBLASTOMA	2,0
Questão 56	Pontuação Total: 3,0
ESTADIAR A LESÃO, REALIZANDO TOMOGRAFIA DE TÓRAX E ABDOME A PROCURA DE METÁSTASES (PRINCIPALMENTE PULMONAR E NO RIM CONTRALATERAL), INVASÃO DE VEIA RENAL E CAVA INFERIOR. A REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA POR AGULHA PARA CONFIRMAR O DIAGNÓSTICO PODE OU NÃO SER REALIZADA DE ACORDO COM O PROTOCOLO SEGUIDO. NOS TUMORES MAIORES (COMO É O DO CASO), REALIZA-SE QUIMIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA PARA DIMINUIR A CHANCE DE ROTURA TUMORAL NO ATO CIRÚRGICO..	3,0
Questão 57	Pontuação Total: 3,0
LAPAROTOMIA TRANSVERSA EM HIPOCÔNDRIO/ FLANCO ESQUERDO COM INVENTÁRIO DA CAVIDADE A PROCURA DE METÁSTASES, REALIZAÇÃO DE NEFRECTOMIA RADICAL COM LIGADURA DOS VASOS RENAI (PRIMEIRO A VEIA E DEPOIS A ARTÉRIA) PRÓXIMOS A AORTA E VEIA CAVA INFERIOR, LIGADURA DO URETER O MAIS DISTAL POSSÍVEL, COLETA DE AMOSTRAGEM DE LINFONODOS DO HILO RENAL, PERIAÓRTICOS PARA ESTADIAMENTO DA LESÃO.	3,0
Questão 58	Pontuação Total: 2,0
NEUROBLASTOMA.	2,0
TUMOR DE CÉLULAS CLARAS	0,5
NEFROMA MESOBLÁSTICO	1,0
TUMOR RABDOIDE DE RIM	1,0

CASO 17

Questão 59	Pontuação Total: 4,0
Reconstrução pode ser com tecido autólogo (retalhos), materiais aloplásticos (prótese mamária/expansor de pele), ou associação dos dois. No caso desta paciente, pode-se reconstruir com próteses mamárias pequenas, próteses expansoras ou expansores de pele com posterior troca por próteses. Os retalhos podem ser pediculados, como o retalho do músculo reto abdominal e o grande dorsal, ou microcirúrgicos. Estes podem ser os mesmos já citados ou retalhos perfurantes (diep, sgap, igap, tap). Nos reconstruções associadas geralmente se utilizam próteses mamárias com o retalho do músculo grande dorsal.	4,0
Questão 60	Pontuação Total: 4,0
A PACIENTE APRESENTA MASTECTOMIA BILATERAL E UM BOM VOLUME DE PELE E GORDURA EM BAIXO VENTRE. O RETALHO DO MÚSCULO TRANVERSO DO ABDOME (TRAM) MONOPEDICULADO BILATERAL APRESENTA AS SEGUINTE VANTAGENS: CAPACIDADE DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL IMEDIATA, BOM VOLUME, BOM TEMPO CIRÚRGICO (PELA MÉDIA COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO E MANUTENÇÃO DA PACIENTE NA MESMA POSIÇÃO CIRÚRGICA), PROCEDIMENTO DEFINITIVO (TEMPO ÚNICO E SEM NECESSIDADE DE TROCAS POSTERIORES), SEM USO DE MATERIAL ALOPLÁSTICO (NO CASO DA PACIENTE A HISTÓRIA PRÉVIA DE USO DE SILICONE INDUSTRIAL LÍQUIDO DEVE SER CONSIDERADA).	4,0
Questão 61	Pontuação Total: 2,0
A INCISÃO MEDIANA PRÉVIA ABAIXO DO UMBIGO. CONSIDERANDO QUE O ACESSO INTRA-ABDOMINAL PELA INCISÃO MEDIANA OCORRE PELO ACESSO DIRETO NA LINHA ALBA, NÃO HAVERIA COMPROMETIMENTO DOS VASOS PERFURANTES DA REGIÃO. CONSIDERANDO O ESTUDO DAS ÁREAS DE PERFUSÃO DO TRAM MONOPEDICULADO, A INCISÃO MEDIANA PRÉVIA PODERIA SEPARAR POR COMPLETO O FLUXO DOS DOIS RETALHOS, MELHORANDO A CHANCE DE PERFUSÃO DA ZONA III DE AMBOS OS LADOS.	2,0

CASO 18

Questão 62	Pontuação Total: 1,5
REATIVAÇÃO DA TUBERCULOSE, BRONQUIECTASIA, NEOPLASIA.	1,5
Questão 63	Pontuação Total: 1,5
MICETOMA, BOLA FÚNGICA OU ASPERGILOMA	1,5
Questão 64	Pontuação Total: 2,0
CONTAMINAÇÃO DE CAVERNA TUBERCULOSA POR FUNGOS.	2,0
CAVITAÇÃO CICATRICAL DE TUBERCULOSE.	1,0
Questão 65	Pontuação Total: 3,0
LOBECTOMIA SUPERIOR DIREITA. EMPIEMA PLEURAL, SANGRAMENTO E FÍSTULA BRÔNQUICA. PNEUMONIA, SEGMENTECTOMIA, ACTELECTASIA, INFECÇÃO PULMONAR, PNEUMONIA FÚNGICA OU HEMOTORAX.	3,0
Questão 66	Pontuação Total: 2,0
BRONCOSCOPIA RÍGIDA COM LAVAGEM, EMBOLIZAÇÃO POR ARTERIOGRAFIA E INTUBAÇÃO SELETIVA	2,0

CASO 19

Questão 67	Pontuação Total: 2,5
Prostatismo; hiperplasia prostática benigna	2,5
Questão 68	Pontuação Total: 2,5
Ultrassonografia de vias urinárias e próstata (ou vias urinárias e pelve); PSA e exame de urina tipo I.	2,5
Questão 69	Pontuação Total: 2,5
Ressecção transuretral da próstata.	2,5
Questão 70	Pontuação Total: 2,5
Finasterida: antagonista da 5-alfa redutase: redução do volume prostático. Tamsulosina: bloqueador alfa-adrenérgico: relaxamento da musculatura da uretra prostática e melhora do fluxo urinário.	2,5

CASO 20

Questão 71	Pontuação Total: 1,5
1 – ISQUEMIA AGUDA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.	1,5
Questão 72	Pontuação Total: 1,5
2 – TROMBOSE DE ANEURISMA DE POPLÍTEA.	1,5
Questão 73	Pontuação Total: 3,0
3 – EMBOLIA ARTERIAL E TROMBOSE ARTERIAL ATEROSCLERÓTICA AGUDA.	3,0
Questão 74	Pontuação Total: 1,5
4 – TROMBECTOMIA E REVASCULARIZAÇÃO.	1,5
Questão 75	Pontuação Total: 1,5
5 – FASCIOTOMIA.	1,5
Questão 76	Pontuação Total: 1,0
6 – AMPUTAÇÃO PRIMÁRIA.	1,0