



FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

RESIDÊNCIA MÉDICA 2015

Especialidades com Pré-Requisito em Medicina Intensiva

Gabarito da Prova realizada em 23/nov/2014

A Banca Examinadora alerta que o gabarito divulgado corresponde a um padrão de respostas esperado e não exaure as possibilidades de respostas certas. Sinonímias que mantenham o nível de precisão da resposta são consideradas igualmente corretas.

CASO 1

Questão 01	Pontuação Total: 5,0
Trombose de veia renal	5,0
Questão 02	Pontuação Total: 5,0
US Doppler de veias renais	5,0

CASO 2

Questão 03	Pontuação Total: 10,0
VITAMINA B1 (TIAMINA) VITAMINA B6 (PIRIDOXINA) VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)	TRÊS CORRETAS: 10 PONTOS; DUAS CORRETAS: 6 PONTOS; UMA CORRETA: 3 PONTOS.

CASO 3

Questão 04	Pontuação Total: 4,0
Ruptura do septo interventricular	2,0
Insuficiência mitral aguda por ruptura do músculo papilar/cordoalha tendinea	2,0
(Somente insuficiência mitral será considerado errado)	
Questão 05	Pontuação Total: 3,0
Ecocardiografia transtorácica	3,0
(ecocardiograma transesofágico é contraindicado)	
Questão 06	Pontuação Total: 3,0
Cirurgia de urgência	3,0

CASO 4

Questão 07	Pontuação Total: 5,0
Recebeu oxigênio em altas doses na ambulância/ hipercapnia por oxigenioterapia inadequada	5,0
Questão 08	Pontuação Total: 5,0
Ventilação não invasiva (VNI) ou BiPAP	5,0

CASO 5

Questão 09	Pontuação Total: 2,0
Megacólon tóxico	1,0
Perfuração colônica ou intestinal (abdome agudo perfurativo)	1,0
Questão 10	Pontuação Total: 2,0
Intubação orotraqueal	2,0
Questão 11	Pontuação Total: 3,0
Corticoide intravenoso (metilprednisolona, hidrocortisona ou dexametasona)	3,0
Questão 12	Pontuação Total: 3,0
Proceder á cirurgia de emergência	3,0

CASO 6

Questão 13	Pontuação Total: 6,0
PACIENTE I: TEMPESTADE TIREOIDEANA OU CRISE TIREOTÓXICA	3,0
PACIENTE II: COMA MIXEDEMATOSO	3,0
Questão 14	Pontuação Total: 4,0
CORTICOESTEROIDE	4,0

CASO 7

QUESTÃO 15	Pontuação Total: 4,0
Coleta de líquido cefalorraquidiano/ punção lombar	4,0
Questão 16	Pontuação Total: 3,0
Nevralgia trigeminal	3,0
Questão 17	Pontuação Total: 3,0
Carbamazepina	3,0

CASO 8

Questão 18	Pontuação Total: 10,0
Só prolongado de bifosfonato (alendronato)	10,0

CASO 9

Questão 19	Pontuação Total: 2,0
Estudo de coorte	1,0
Retrospectiva OU histórica	1,0
Questão 20	Pontuação Total: 5,0
A-correta, B-incorreta, C-incorreta, D-correta, E-incorreta (ATENÇÃO: conforme consta na questão, cada resposta inadequada anula uma adequada).	1,0 Para cada Item
Questão 21	Pontuação Total: 3,0
Ensaio clínico ou Estudo de intervenção ou Estudo controlado	1,0
Duplo-cego	1,0
Randomizado	1,0
(Se colocar estudo observacional ou caso-controle, mesmo que coloque duplo-cego e randomizado, será considerado zero para a questão inteira).	

CASO 10

Questão 22	Pontuação Total: 2,0
S-Beta talassemia	2,0
Questão 23	Pontuação Total: 2,0
Síndrome torácica aguda	2,0
Questão 24	Pontuação Total: 2,0
Hiper-hidratação Hipersedação (ou uso excessivo de morfina ou de opioide no lugar de hipersedação)	1,0 (Para cada Item)
Questão 25	Pontuação Total: 1,0
Hidroxiureia	1,0
Questão 26	Pontuação Total: 3,0
Síndrome Hemofagocítica (hematofagocitose, linfohistiocitose hemofagocítica)	3,0

CASO 11

Questão 27	Pontuação Total: 4,0
Síndrome DRESS (reação a droga, eosinofilia, sintomas sistêmicos - Drug Reaction, Eosinophilia, Systemic Symptoms)	4,0
Questão 28	Pontuação Total: 3,0
Eosinofilia	3,0
Questão 29	Pontuação Total: 3,0
Suspensão da fenitoína	3,0

CASO 12

Questão 30	Pontuação Total: 4,0
Dosagem de alfa-fetoproteína sérica	4,0
Questão 31	Pontuação Total: 6,0
Infecção por vírus da hepatite B	2,0
Infecção por vírus da hepatite C	2,0
Etilismo	2,0

CASO 13

Questão 32	Pontuação Total: 10,0
A: Choque séptico ou sepsis ou sepse ou insuficiência respiratória ou septicemia ou disfunção múltipla de órgãos	3,0
B: Pneumonia ou pneumonia aspirativa ou sepse de foco pulmonar	2,0
C: Broncoaspiração ou disfagia	2,0
D: Câncer de esôfago (ou Carcinoma epidermoide de esôfago ou neoplasia maligna de esôfago)	3,0
ATENÇÃO: CONFORME INSTRUÍDO NA PROVA, CASO DEIXAR UM CAMPO VAZIO A QUESTÃO SERÁ CONSIDERADA COM NOTA FINAL ZERO.	

CASO 14

Questão 33	Pontuação Total: 5,0
Jejum	1,0
Passagem de sonda nasogástrica	1,0
Haloperidol	1,0
Escopolamina	1,0
Dexametasona.	1,0
Questão 34	Pontuação Total: 2,0
Morfina parenteral (intravenosa ou subcutâneo)	1,0
20 mg/dia	1,0
Questão 35	Pontuação Total: 3,0
Octreotide	3,0

CASO 15

Questão 36	Pontuação Total: 2,0
Nenhum	2,0
(NÃO aceitar qualquer pedido de exame)	
Questão 37	Pontuação Total: 8,0
Risco de complicação cardíaca: manter losartana 50 mg/dia	1,0
Manter atenolol 50 mg/dia	1,0
Manter AAS 100 mg/dia	1,0
Eletrocardiograma diário nas primeiras 72h	1,0
Troponina diária nas primeiras 72h,	1,0
Torvastatina 20 mg/dia	1,0
Risco tromboembólico: enoxaparina 40mg SC ao dia, iniciar 12h antes ou no máximo 24h após o procedimento e manter por 4 semanas.	2,0
ATENÇÃO: CONFORME INSTRUÍDO NA PROVA, CASO CITE MEDICAÇÕES SEM VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSE OU TEMPO DE USO O ITEM SERÁ CONSIDERADO ERRADO.	

CASO 16

Questão 38	Pontuação Total: 2,0
Sim	2,0
Questão 39	Pontuação Total: 2,0
Teste de respiração espontânea (ou TRE) OU tubo-T OU pressão de suporte baixo (≤ 7) por 30 min a 2 horas.	2,0
Se responder SIM na questão 38, a resposta isolada de pressão de suporte baixo está correta.	2,0
Questão 40	Pontuação Total: 6,0
A) Modo volume controlado (também aceitar: volume assistido-controlado, ou volume assisto-controlado)	2,0
B) Modo pressão controlada (também aceitar: pressão assistido-controlada, pressão assisto-controlada)	2,0
C) Modo pressão de suporte	2,0

CASO 17

Questão 41	Pontuação Total: 6,0
B, C, D, A	Quatro corretas: 6 Pontos Três corretas: 4 pontos Duas corretas: 2 pontos; Uma correta: 1 ponto.
Questão 42	Pontuação Total: 4,0
Granulomatose de Wegener (Poliangeíte com granulomatose)	2,0
Poliarterite nodosa,	2,0
Churg Strauss	2,0
Poliangeíte microscópica	2,0

CASO 18

Questão 43	Pontuação Total: 4,0
Punção de Marfan ou punção pericárdica	4,0
Questão 44	Pontuação Total: 6,0
Tuberculose pericárdica	3,0
Linfoma (ou pericardite neoplásica)	3,0

CASO 19

Questão 45	Pontuação Total: 5,0
Infecção de corrente sanguínea (ou bacteremia) associada a cateter.	5,0
Se o candidato responder somente a “infecção de corrente sanguínea” SEM a associação com cateter.	2,0
Questão 46	Pontuação Total: 5,0
Trocar os antibióticos para carbapenêmicos (ou imipenem ou meropenem) e trocar o cateter de sítio (ou retirar o cateter).	5,0
(ATENÇÃO: é obrigatório responder os dois itens dessa resposta corretamente. Somente um item correto o candidato recebe ZERO ponto).	

CASO 20

Questão 47	Pontuação Total: 5,0
Dímero-d	10,0